

## **Jo puc aturar la Tuberculosi**

**DIMARTS 24 DE MARÇ DE 2009**  
**DIA MUNDIAL DE LA TUBERCULOSI**

El proper 24 de març de 2009, per vint-i-setè any consecutiu, se celebra el Dia Mundial de la Tuberculosi amb el lema “Jo puc aturar la tuberculosi”, que fa referència a la necessitat d’actuar localment per tal d’aconseguir l’eliminació mundial de la tuberculosi.

La tuberculosi pulmonar és una malaltia contagiosa que es transmet per via aèria; en absència de tractament, cada pacient amb tuberculosi contagia, per terme mitjà, entre 10 i 15 persones l’any.

El 2006 es van enregistrar arreu del món 9,2 milions de nous casos de tuberculosi (139 per 100.000 habitants), entre els quals, 4,1 milions (44%) eren nous casos de tuberculosi contagiosa i 0,7 milions (8%) eren persones infectades pel virus de la immunodeficiència humana (VIH). Aquest mateix any, l’Organització Mundial de la Salut estima en 0,5 milions els casos de tuberculosi multiresistent i 1,7 milions de morts per tuberculosi dels quals 0,2 milions són persones infectades pel VIH.

A 27 països de la Unió Europea i 3 països de EEA/EFTA<sup>1</sup>, l’any 2007, s’enregistraren 84.917 casos, el que correspon a una taxa promig de 16,9 casos per 100.000 habitants amb una gran variabilitat entre els països, enregistrant-ne les taxes més altes a Romania (118) i Bulgària (40) i els països bàltics (rang entre 36 i 71 casos per 100.000 habitants).

A Catalunya, l’any 2007 es van registrar 1.674 casos de tuberculosi, cosa que correspon a una taxa de 23,2 casos per 100.000 habitants, un 7% superior a la de l’any 2006. La taxa d’incidència de tuberculosi en persones nascudes a l’estranger ha estat superior a la registrada entre les autòctones. L’evolució de la tuberculosi

---

<sup>1</sup> EEA, European Economic Area. EFTA, European Free Trade Association



els últims anys ha estat irregular: s'ha produït un alentiment de la davallada que ha estat constant des de mitjans dels anys 90 fins a l'actualitat. En aquest període de temps s'ha observat un augment progressiu del nombre de casos de tuberculosi en immigrants procedents de països on la prevalença d'infecció tuberculosa és alta. Així, la proporció d'immigrants entre els casos de tuberculosi s'ha triplicat en un curt període de temps, i ha passat del 16,8% l'any 2000 fins al 44% l'any 2007 i al 46% l'any 2008. L'estancament de la davallada de la incidència posa de manifest que les tasques de prevenció i control de la tuberculosi en el conjunt del territori són complexes.

Per fer-hi front, el Departament de Salut, en col·laboració amb el conjunt del sistema sanitari, està implantant diverses mesures per fer front a la tuberculosi, que essencialment s'orienten a:

1. Disminuir el retard diagnòstic dels casos de tuberculosi contagiosa.
2. Adaptar les activitats de prevenció i control a la nova realitat demogràfica.
3. Implementar un model organitzatiu i informatiu que permeti millorar el procés i assolir la màxima efectivitat i eficiència de les activitats assistencials, de prevenció i de control de la tuberculosi.
4. Diversificar i ampliar formes supervisades de tractament i garantir la continuïtat del subministrament de fàrmacs antituberculosos de primera i segona línia.
5. Reforçar el sistema de vigilància epidemiològica en general i en particular la vigilància de l'aparició de soques resistents als fàrmacs habitualment disponibles.


A escala mundial, els objectius que s'esperen aconseguir durant el Dia Mundial són incrementar el compromís i el suport financer i polític en favor de la lluita mundial i local contra la tuberculosi. Aquesta jornada ha de servir per difondre els següents missatges:

1. No s'està responenent a la tuberculosi resistent als medicaments amb la rapidesa i el compromís deguts.
2. Líders de tot el món han reconegut la necessitat urgent de fer front a la co - epidèmia del VIH i tuberculosi. Ara és el moment que els països ofereixin serveis assistencials contra la tuberculosi a totes les persones que viuen amb el VIH i contra el VIH a tots els afectats per la tuberculosi.
3. Hi ha molts interrogants urgents sobre la tuberculosi als quals només es pot respondre mitjançant la investigació científica. Cal més investigació bàsica per entendre millor la naturalesa complexa del bacil de la tuberculosi; estudis transnacionals perquè els descobriments científics es transformin en fàrmacs nous i millors, mètodes diagnòstics i noves vacunes, i investigació operativa per fer més accessibles i eficients els serveis sanitaris per al control de la tuberculosi.
4. Quatre de cada deu persones que emmalalteixen de tuberculosi no obtenen un diagnòstic i tractament correctes. Per arribar-hi, es necessita

que els programes públics de tuberculosi es coordinin amb altres actors que ofereixen serveis contra la tuberculosi, proveïdors privats de serveis assistencials i organitzacions comunitàries.

Ara és el moment de convèncer sobre la necessitat d'aplegar en aquest Dia Mundial totes les persones afectades i els professionals que treballen en la assistència al malalt i el control de la tuberculosi. Aquest dia és un bon moment per renovar i reafirmar el compromís amb el control d'aquesta malaltia a Catalunya. La dimensió mundial associada a aquesta malaltia requereix també un major compromís en la contribució de tothom al control de la tuberculosi en els països d'incidència elevada.


### Evolució de la tuberculosi a Catalunya. 1990-2008



\* Dades provisionals

**Jo puc aturar la Tuberculosi**  
 DIMARTS 24 DE MARÇ DE 2009, DIA MUNDIAL DE LA TUBERCULOSI

### Evolució de la incidència a Catalunya segons el lloc de naixement. 2000-2008




\*Dades provisionals

#### Jo puc aturar la Tuberculosi

DIMARTS 24 DE MARÇ DE 2009, DIA MUNDIAL DE LA TUBERCULOSI

### Evolució de la incidència a Catalunya segons el lloc de naixement. 2000-2008



\*Dades provisionals

#### Jo puc aturar la Tuberculosi

DIMARTS 24 DE MARÇ DE 2009, DIA MUNDIAL DE LA TUBERCULOSI